

精神醫療院所藥物濫用個案通報統計

依據台灣地區辦理藥癮戒治精神醫療院所通報藥物濫用個案統計顯示，被濫用藥物種類以（甲基）安非他命及海洛因為主，目前個案通報統計之排名，依序為海洛因、（甲基）安非他命、苯二氮平類（Benzodiazepines）安眠鎮靜劑、佐沛眠及愷他命等（如表一及表二），而苯二氮平類安眠鎮靜劑之濫用以氟硝西洋為主（如表三）。

海洛因之通報量一直居高不下，乃因其成癮性高、戒治困難，濫用者常因戒治失敗而多次出入醫療院所，目前已有替代療法因應。

表一、台灣地區精神醫療院所通報戒癮個案濫用藥物種類排名

排名 年別	第一位	第二位	第三位	第四位	第五位
88年	(甲基)安非他命 (52.5%)	海洛因 (42.3%)	強力膠 (9.5%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (8.5%)	可待因 (1.6%)
89年	海洛因 (52.7%)	(甲基)安非他命 (50.6%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (11.0%)	強力膠 (7.0%)	嗎啡 (1.2%)
90年	海洛因 (63.9%)	(甲基)安非他命 (42.0%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (9.7%)	強力膠 (6.5%)	MDMA (4.6%)
91年	海洛因 (81.4%)	(甲基)安非他命 (28.1%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (5.0%)	MDMA (3.3%)	強力膠 (3.0%)
92年	海洛因 (88.8%)	(甲基)安非他命 (18.7%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (5.3%)	MDMA (1.8%)	強力膠 (1.6%)
93年	海洛因 (93.8%)	(甲基)安非他命 (21.8%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (3.5%)	MDMA (0.8%)	強力膠 (0.6%)
94年	海洛因 (93.5%)	(甲基)安非他命 (32.8%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (4.5%)	MDMA (1.1%)	愷他命(0.9%)
95年	海洛因 (93.8%)	(甲基)安非他命 (29.0%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (7.3%)	愷他命 (0.8%)	強力膠 (0.7%)
96年	海洛因 (93.8%)	(甲基)安非他命 (34.1%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (3.1%)	愷他命 (0.8%)	佐沛眠 (0.7%)
97年	海洛因 (93.0%)	(甲基)安非他命 (26.3%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (2.0%)	佐沛眠 (1.6%)	愷他命 (0.9%)
98年	海洛因 (92.3%)	(甲基)安非他命 (28.2%)	Benzodiazepines 類 安眠鎮靜劑 (2.2%)	佐沛眠 (1.8%)	愷他命 (1.1%)

註：

1. 資料來源：行政院衛生署食品藥物管理局。
2. 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

表二、台灣地區精神醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次

種類	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年
海洛因、嗎啡、鴉片	967	937	1,547	2,295	6,259	7,370	11,535	11,532	11,268	17,690	20,152	17,745
(甲基)安非他命	861	1,120	1,452	1,490	2,152	1,551	2,663	4,021	3,473	6,411	5,682	5,393
強力膠、有機溶劑	161	203	201	229	233	130	76	89	85	84	102	79
Benzodiazepines 類安眠鎮靜劑	335	181	315	344	386	441	431	547	865	576	442	421
MDMA(俗稱搖頭丸)	2	1	9	164	251	152	103	135	77	125	147	56
可待因 (Codeine)	33	35	30	19	5	6	6	9	13	10	9	6
大麻	7	16	23	145	62	47	43	39	25	38	55	28
配西汀 (Pethidine)	18	18	6	4	8	102	26	19	29	87	66	43
潘他唑新 (Pentazocine、 俗稱速賜康)	2	3	3	1	0	4	3	0	0	3	3	6
特拉嗎竇 (Tramadol)	2	0	0	0	0	3	10	0	1	16	26	11
愷他命 (Ketamine)	0	0	0	0	18	42	49	105	99	150	200	201
古柯鹼 (Cocaine)	—	2	1	23	3	1	1	4	3	14	7	2
佐沛眠 (Zolpidem)	—	0	4	1	1	4	29	26	48	135	335	349
通報個案數 (件)	1,060	2,132	2,871	3,545	7,654	8,283	12,232	12,258	11,964	18,784	21,610	19,126

註：

1. 資料來源：流行病學訓練班(86/01~87/06)、前行政院衛生署管制藥品管理局(87/07~98/12)、行政院衛生署食品藥物管理局(99/01~迄今)。
2. 每一個案可能使用一種或一種以上之藥物。

表三、精神醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines 類分布統計表

單位：人次

種類	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年
Alprazolam(俗稱蝴蝶片)	0	1	5	29	4	5	18	4	99	25	42	36
Bromazepam	4	0	1	0	1	0	2	3	1	0	1	0
Brotizolam	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0
Clonazepam	0	1	3	4	0	0	8	5	1	1	0	1
Diazepam(安定、煩寧)	62	45	63	32	75	68	57	43	51	48	61	30
Estazolam	0	0	1	1	2	2	6	5	3	5	14	33
Flunitrazepam(FM2, 俗稱十字架)	163	119	188	266	296	353	301	430	579	413	273	251
Lorazepam	2	0	4	3	0	0	10	7	3	9	12	30
Midazolam	0	0	1	0	1	0	1	0	5	3	1	9
Nimetazepam (一粒眠、俗稱K5、紅豆)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
Oxazepam	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Triazolam(俗稱小白板)	16	10	22	3	4	7	6	1	61	8	4	16
未明品項之 Benzodiazepines	84	5	25	6	3	4	14	44	55	60	23	8
合計	335	181	315	344	386	441	431	547	860	576	442	416

註：

1. 資料來源：流行病學訓練班(86/01~87/06)、前行政院衛生署管制藥品管理局(87/07~98/12)、行政院衛生署食品藥物管理局(99/01~迄今)。
2. 每一個案可能使用一種或一種以上之 Benzodiazepines 藥物。